

鎮咳去痰薬

コールドトップ® B液

第②類医薬品

コールドトップB液は、せきの中樞に働いて鎮咳作用をあらわすジヒドロコデインリン酸塩、のどからんだ粘稠なたんの排出を容易にしてせきをしずめる去痰作用のグアイフェネシンなどを配合した飲みやすい鎮咳去痰薬でせきやたんによく効きます。

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい

12才未満の小児

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい

(眠気等があらわれることがあります。)

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい

5. 過量服用・長期連用しないで下さい

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症



2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

効能又は効果

せき、たん

成分と作用 本品1日量(30mL)中

成分	分量	作用
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せき中枢に直接はたらいて、せきをしずめます。
グアイフェネシン	300mg	気道の分泌を促進し、たんの粘度を下げ、たんを出やすくして呼吸を楽にします。
dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	収縮した気管をひろげ呼吸を楽にし、せきをしずめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	アレルギー性のせきに効果をあらわします。
キキョウ流エキス	1mL (原生薬換算1g)	気道の分泌を促進し、たんの粘度を下げ、たんを出やすくして呼吸を楽にします。

添加物として白糖、l-メントール、パラベン、安息香酸Na、エタノール、カラメル、プロピレングリコール、香料を含有します。

用法及び用量

次の量を添付の目盛りつきコップ（10mL）ではかり、服用して下さい。

年齢	1回量	用法及び用量
15才以上	5mL	1日3回、食後服用して下さい。必要な場合には、就寝前に服用して下さい。また場合によっては、1日6回まで服用することも差し支えありませんが、約4時間の間隔をおいて服用して下さい。
12才以上15才未満	3mL	
12才未満	服用しないこと	

<用法及び用量に関連する注意>

- (1) 用法及び用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- (5) いったん開封後は、品質保持の点からなるべく早く服用して下さい。

■お問い合わせ先

伊丹製薬株式会社 お客様相談室 TEL 0740-22-2059
受付時間：9時から16時30分まで（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度
☎0120-149931



製造販売元 **伊丹製薬株式会社**

滋賀県高島市今津町下弘部280番地